


SCHEDA DI RICONOSCIMENTO

***Lycaena dispar* (Haworth, 1802) – Licena delle paludi**
(Lepidoptera, Lycaenidae)

Identificazione: *Lycaena dispar* è una farfalla di piccole dimensioni (apertura alare: 33 – 50 mm circa) che presenta un evidente dimorfismo sessuale. Nel maschio le ali sono arancione lucente sottilmente bordate di scuro; nelle ali posteriori, che hanno una banda scura nella parte interna, questa banda è in contatto con una serie di punti dello stesso colore; sono presenti piccole strie discocellulari scure. Nella femmina, le ali anteriori, con una banda scura marginale, portano diverse macchie nere: due al centro dell'ala ed una serie postmediale con forma allungata; le ali posteriori, ampiamente velate di bruno scuro, hanno una banda submarginale arancione dai margini dentellati che in alcuni casi si allunga in sottili striature lungo le venature. Ventralmente le ali anteriori di entrambe i sessi sono di color arancione pallido e portano una serie di punti neri bordati di chiaro. Le ali posteriori sono grigie con una serie di punti neri bordati di bianco disposti irregolarmente nella regione basale e che formano una serie postmediale; è inoltre presente una fascia arancione submarginale bordata di due piccole serie parallele di punti che non arriva all'apice dell'ala. Le antenne sono anellate di grigio e nero con clava nera ed apice giallastro. La specie può essere confusa con alcune specie congeneriche ma è possibile distinguerla da queste attraverso una attenta osservazione del pattern e per le sue maggiori dimensioni.

Biologia ed ecologia: specie igrofila che frequenta prati umidi, paludi, risaie, bordi di canali, laghetti ecc. con vegetazione erbacea alta almeno 40 cm dove sono presenti le piante nutrici della larva, diverse specie appartenenti al genere *Rumex*. In Italia è presente nelle regioni del nord e del centro fino alla Toscana e vola dal livello del mare fino a 500 m circa. La specie presenta generalmente 2 o 3 generazioni annue (in rapporto alla latitudine) e vola tra aprile e ottobre.

Maschio di *Lycaena dispar***Distribuzione in Italia****Femmina di *Lycaena dispar*****Ali in visione ventrale**